



ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE CEBU

PATRON DE LA RAZA GYR

NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
1 APARIENCIA GENERAL			
1.1 Estado General.	Sano y vigoroso.		
1.2 Desarrollo.	Bueno de acuerdo a la edad.	Medio	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución, Esqueleto y Musculatura.	Constitución robusta. Esqueleto fuerte. Musculatura compacta bien distribuida por todo el cuerpo. Para los animales de biotipo lechero: constitución ligera, esqueleto fuerte, musculatura limpia, firme y bien distribuida por el cuerpo, sin excesos.	Constitución media. Esqueleto y Musculatura regulares.	Constitución débil o tosca. Conformación leonina. Mala distribución muscular o exceso de gordura.
1.4 Masculinidad y Femenidad.	Caracteres bien definidos de acuerdo al sexo.		Caracteres inversos.
1.5 Temperamento.	Activo y dócil.		Nervioso, indócil o bravo.
2 CABEZA			
2.1 Apariencia General.	De ancho y largo medios.		Pesada. Asimétrica. Desproporcionada en relación al cuerpo.
2.2 Perfil .	Con frente ultraconvexo y región paranasal (cara) rectilínea.		
2.3 Frente.	Ancha, lisa y prominente, con el testuz vuelto para atrás.		Cresta ósea.
2.4 Región Paranasal (Cara).	Recta, ancha y proporcional en los machos, mas estrecha y delicada en las hembras.	Levemente acarnerada.	Desvío. Depresión. Convexidad (Acarnerado). Excesivamente largo y estrecho.
2.5 Hocico.	Negro y ancho, con ollares dilatados y separados.		Espejo nasal de color claro, rosado marmolizado o rojizo. Labio leporino.
2.6 Ojos.	Negros u oscuros. Elípticos, situados bien lateralmente y protegidos por arrugas de la piel en los párpados superiores. Pestañas negras.	Pestañas mezcladas en los animales de pelaje claro. Ceguera unilateral adquirida.	De color blanco, amarillo cobre. Exoftálmicos (saltones). Pestañas blancas o rojizas. Ceguera bilateral.
2.7 Orejas.	De largo medio, típicas, pendientes, comenzando en forma de tubo con su porción superior enrollada sobre sí misma abriéndose enseguida, gradualmente para afuera, curvándose en la punta con la extremidad curvada y vuelta para la cara (Gavilán).		Muy cortas. Muy largas. Movimientos vivos. Ausencia de Gavilán. Apéndice suplementario.
2.8 Cuernos.	De color oscuro, medios, simétricos, de sección elíptica, achatados gruesos en la base, saliendo para abajo y para atrás si perjudicar el movimiento de las orejas. Son preferidos los que se dirigen un poco para arriba., curvándose para adentro, con las puntas convergentes y vueltas para atrás. En la variedad Mocha, ausencia de cuernos.	En la variedad mocha. Presencia de botón. Presencia de callo (tejido córneo, plano, móvil de color negro y si base ósea.	Móviles. Gruesos y redondos. Predominancia de color blanco. En la variedad Mocha, rundimientos de cuernos o cualquier señal de cirugía.
2.9 Boca.	De abertura media, labios formes.		Prognatismo. Agnatismo.
3 PESCUUEZO Y CUERPO			
3.1 Pescuezo.	Medio, línea superior ligeramente oblicua, bien musculoso y con implantación armoniosa al tronco. Delicado en las hembras. Para los animales de biotipo lechero: pescuezo descarnado y armonioso.		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino.
3.2 Papada.	Comienza bifida, debajo de la quijada media, con pliegues, suelta y flexible, extendiéndose hasta el ombligo. Más abundante y plegada en los machos.		Reducida o excesiva.

3.3 Pecho.	Ancho, con buena cobertura muscular. Para los animales de biotipo lechero: largo y limpio.		Estrecho, acumulación excesiva de grasa.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz, desarrollada en forma de riñón o castaña de Cajú, apoyándose sobre el dorso en los machos. Menos desarrollada y caracterizada en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinada. Pequeñas depresiones laterales.	Poco desarrollada. Adelantada. Redondeada en los machos. Escesivamente inclinada, caída y/o cualquier señal de cirugía correctiva.
3.5 Dorso y Lomo.	Ancha, recta, levemente inclinada tendiendo a la horizontal unida armoniosamente a la grupa, presentando buena cobertura muscular. Para los animales de biotipo lechero: armoniosamente continuado a la grupa, presentando una cobertura muscular consistente.		Fuertemente inclinada. Presencia de Lordosis, Xifosis o Escoliosis.
3.6 Ancas y Grupa.	Ancas bien separadas y en el mismo nivel, moderadamente salientes. Grupa larga, ancha, tendiendo a la horizontal, en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes o depresiones y bien revestida de músculos. Para los animales de biotipo lechero: con cobertura muscular mas ligera y consistente.		Ancas poco separadas, demasiado salientes. Grupa corta, estrecha, excesivamente inclinada y pobre de músculos.
3.7 Sacro.	No saliente, en el mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente.	Muy saliente.
3.8 Cola y Mota (Mechón).	Cola con inserción armoniosa, sobrepasando los jarretes o converjones. Mota negra.	En los animales de pelaje sardo claro, sardo rojo, mora roja, moro claro y moro oscuro, estolerada la motablanca o mezclada, siempre que la piel sea negra u oscura. Se admiten pequeñas manchas de despigmentación en los animales de pelajes claros siempre que no presenten reflejos en otras partes del cuerpo. En los animales de pelaje rojizo, rojo sardo, rojo gargantillo, es tolerada la mota mezclada o compuesta de hilos blancos, siempre que estos estén en menor porcentaje y que la piel sea negra u oscura.	Cola con inserción muy alta. Mota blanca en los animales de pelajes con predominancia de colores rojo o amarillo. Mota rojiza.
3.9 Torác, Costillas, Flancos y Vientre.	Torác amplio, largo y profundo. Costillas largas, anchas y separadas bien arqueadas, con espacios intercostales bien revestidos de músculo, sin depresiones atrás de la espalda. Flanco y vientre con musculatura firme. Para los animales de biotipo lechero: costillas limpias y con una musculatura menos pronunciada. Flancos con ligera concavidad y ausencia de grasa.		Torác deprimido (Acoletádo) Flanco y Vientre con musculatura flácida.
3.10 Ombligo.	Reducido. Proporcional al desarrollo del animal.	Medio.	Exageradamente corto o largo, que sobrepase el orificio de prepucio. Cualquier señal de cirugía correctiva. Con hernia.
4 MIEMBROS			

4.1 Miembros Anteriores.	De largo, medio, bien musculosos, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados. Con osartura fuerte y musculosa. Espaldas largas y oblicuas, bien cubiertas de músculos insertándose armoniosamente al torác. Para los animales de biotipo lechero: con musculatura mas ligera.		Excesivamente largo o cortos de desproporción al cuerpo. Aplomo defectuosos.
4.2 Miembros Posteriores.	De largo medio, músculos y piernas anchas, con buena cobertura muscular, descendiendo hasta los corvejones con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas. Para los animales de biotipo lechero: muslos y piernas con cobertura muscular adecuada para acondicionamiento de buena ubre en las hembras, sin cumulo de grasa. En los machos, nalgas menos evidenciadas.		Excesivamente largos o cortos en desproporción al cuerpo. Excesivamente rectos o curvos u otros defectos de aplomos. Muslos o nalgas con deficiente formación muscular.
4.3 Pezuñas.	Negras bien conrormadas y resistentes.	Rayas o manchas ligeramente claras en los animales de pelaje claro.	Predominancia de color blanco, rojizo o rayado. Con deformación.
5 ÓRGANOS GENITALES			
5.1 Bolsa Escrotal y Testículos.	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos de desarrollo normal.		Criptorquidismo. Monorquidismo. Hipoplasia. Hiperplasia.
5.2 Vaina.	Reducida proporcional al desarrollo del animal.	Media.	Excesiva. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
5.3 Prepucio.	Recogido, con el orificio dirigido hacia adelante.	Pequeño prolapso.	Relajado.
5.4 Ubre y Pezones.	Ubre de volumen medio, cubierta de piel fina y sedosa. Con pezones de pequeños a medios y bien distribuidos. Para los animales de biotipo lechero: debe ser amplia, larga, ancha y profunda, presentando gran capacidad de almacenaje de leche, volumen compatible a la fase de la lactancia, presentando pliegues cuando esté vacía. La consistencia debe ser suave y elastica (glandulosa). Su base debe ser nivelada y no ultrapasar la línea del corvejon. Debe presentar tambien proporcionalidad entre una parte anterior y posterior. Los cuartos anteriores deben de presentar adelantados para enfrente y adheridos al vientre, y los cuartos posteriores bien proyectados hacia atras y para arriba. Las tetas se deben de presentar integras y simetricas de tamaño y calibre medios, espaciadas entre si, centradas en el cuarto, verticales y paralelas, perpendiculares al suelo. La ubre cuando es vista por atras, se evidencia (observa) el surco del ligamento suspensor central. Los ligamentos deben ser fuertes y bien evidentes, presentandos bien adheridos a la region inguinal y abdominal.		Atrofiada.
6 PELAJE			
6.1 Color.	Rojo en todas sus tonalidades, rojo gargantillo, rojo sardo, sardo rojo, rojo, rojo claro, Mora roja predominancia de color blanco con orejas y cabeza total o parcialmente rojizas. Moro claro: predominancia de color blanco con orejas y cabeza total o pracialmente negras. Moro oscuro: predominancia de color oscuro, con cabeza y orejas negras.		Amarillo - cobre. Barroso. Gris. Negro y totalmente blanco.
6.2 Pelos.	Finos, cortos y sedosos. Tolerándose más largos en climas templados ó húmedos.		
6.3 Piel.	Negra y oscura, suelta y fina, flexible, suave y oleosa, roseada en la ubre y región inguinal.	Pequeños puntos de despigmentación en las partes sombreadas.	Despigmanetación en las partes no sombreadas.
OBSERVACIONES:			

No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía.