



# ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE CEBU

## PATRON DE LA RAZA BRAHMAN

NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
<b>1 APARIENCIA GENERAL</b>			
1.1 Estado General.	Sano y vigoroso.		
1.2 Desarrollo.	Buena de acuerdo a la edad.	Medio	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución, Esqueleto y Musculatura.	Constitución robusta. Esqueleto fuerte. Musculatura compacta y bien distribuida en todo el cuerpo.		Constitución débil o grosera con desarrollo exagerado de los miembros anteriores. Mala distribución muscular o exceso de gordura
1.4 Masculinidad y Femenidad.	Caracteres bien definidos de acuerdo con el sexo y la edad.		Caracteres inversos.
1.5 Temperamento.	Activo y dócil.		Indócil y bravo.
<b>2 CABEZA</b>			
2.1 Apariencia General.	Tamaño y longitud medidas, armoniosa.		Pesada (Desproporcionada en relación al cuerpo. Asimétrica)
2.2 Perfil .	Recto o subconvexo.		Convexo o cóncavo.
2.3 Frente.	Ancha con ligera convexidad o plana.	Pequeña cresta ósea (nimburi).	Convexa. Cresa ósea muy pronunciada.
2.4 Región Paranasal (Cara).	De longitud mediana y recta; amplia y proporcional en el macho. Más larga y delicada en la hembra.		Convexa, acarnerada, desviada o torcida.
2.5 Hocico.	Negro con ollares bien separados y dilatados, en forma de coma.	Despigmentación parcial (lamida) en la superficie de color negro.	Despigmentación mayor de la tercera parte. Labio leporino.
2.6 Ojos.	Negros elípticos, vivos bien separados, orbitas levemente salientes. Bien protegidas por arrugas de piel en los machos.	Pestañas mezcladas con pelos blancos. Ojos gateados.	Exoftalmia. Pestañas blancas. Esclerótica blanca. Párpado invertido (Entropión).
2.7 Orejas.	Tamaño medio, anchura moderada. Ligeramente inclinada y pequeña curvatura en el tercio inferior, con terminación en punta.	Pendulosas y largas	Exageradamente largas y exageradamente cortas. Apéndices suplementarios (doble oreja)
2.8 Cuernos.	Simétricos, de color oscuro.	Pequeñas manchas blancas en la punta o rayados. Descornando a conveniencia del criador. Ausencia natural de cuernos (mocho) con fines comerciales, sin poder participar en juzgamientos.	Blanco y móvil.
2.9 Boca.	Apertura mediana. Labios firmes		Prognatismo. Agnatismo.
<b>3 PESQUEZO Y CUERPO</b>			
3.1 Pescuezo.	Proporcional al cuerpo. Línea superior ligeramente oblicua. Bien musculado en los machos, amplio en su base unido armónicamente al cuerpo y a la cabeza, sin depresiones. Más largo y fino en las hembras		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino, Descarnado
3.2 Papada.	Comienza bífida bajo el maxilar inferior, baja hasta el pecho y se prolonga hasta el ombligo. Tamaño medio, fina y flexible.	Excesiva	Reducida.
3.3 Pecho.	Amplio y bien cubierto de músculos		Estrecho. Acumulación excesiva de grasa.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz, desarrollada. En forma de riñón apoyándose sobre el dorso en los machos	Tamaño medio, ligeramente inclinada, Pequeñas depresiones laterales, Ligeramente adelantada en las hembras.	Poco desarrollada. Excesivamente inclinada. Adelantada o redonda en los machos. Señales de cirugía correctiva

3.5 Dorso y Lomo.	Largo, ancho, recto y profundo. Ligeramente inclinado tendiendo a la horizontal armoniosamente ligado a la grupa. Buena cobertura muscular.,		Fuertemente inclinado. Xifosis, Lordosis y Escoliosis
3.6 Ancas y Grupa.	Ancas en el mismo nivel, separadas y anchas. Grupa larga, ancha, ligeramente inclinada tendiendo a la horizontal en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes ni depresiones, con buena cobertura muscular.		Ancas poco separadas. Excesivamente salientes Grupa corta. Estrechada. Excesivamente inclinada y descarnada.
3.7 Sacro.	Largo, no saliente. Al mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente. Medianamente largo.	Muy saliente. Excesivamente corto.
3.8 Cola y Mota (Mechón).	Cola con inserción armoniosa. Larga rematada en una mota negra.	Media. Mota con algunos pelos blancos mezclados.	Corta. Implantación defectuosa. Mota blanca o mayoría de pelos blancos.
3.9 Toráx, Costillas, Flancos y Vientre.	Torax amplio, largo y profundo. Costillas largas bien arqueadas con espacios intercostales bien revestidos de músculos y sin depresión detrás de las espaldas. Flancos llenos, profundos y armónicos, Vientre en una misma línea paralela al dorso y al lomo.	Ligera depresión detrás de la espalda	Torax deprimido, estrecho costillas poco arqueadas cortas con espacios intercostales muy cerrados. Flancos deprimidos, Vientre voluminoso o pequeño.
3.10 Ombligo.	Reducido	Medio.	Excesivamente corto, largo, penduloso, En machos que sobrepase el orificio del prepucio. Cualquier señal de cirugía correctiva.
<b>4 MIEMBROS</b>			
4.1 Miembros Anteriores.	De longitud media, bien musculosos, colocados en rectángulo, separados y bien aplomados con osatura fuerte. Espalda larga y oblicua insertándose armoniosamente al torax		Miembros excesivamente largos o cortos en desproporción al cuerpo. Osatura grosera o débil. Aplomos defectuosos.
4.2 Miembros Posteriores.	De longitud media, pierna con muslos anchos con buena cobertura muscular bajando hasta el corvejón ( o garrón) con nalgas bien pronunciadas. Piernas bien aplomadas y separadas. Corvejones (o garrones), canillas y demás regiones, fuertes bien definidas con osatura fuerte. En las hembras mas livianas, con musculatura menos acentuada.		Excesivamente largos o cortos, desproporcionados al cuerpo. Rectos o excesivamente curvos, y otros defectos de aplomo. Músculos y nalgas con deficiente formación muscular.
4.3 Pezuñas.	Negras, bien conformadas, fuertes y lisas con poca separación interdígital		Blancas o rayadas. Mal conformadas, agrietadas con separación interdígital muy marcada.
<b>5 ÓRGANOS GENITALES</b>			
5.1 Bolsa Escrotal y Testículos.	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos simétricos de desarrollo normal	Pequeñas despigmentaciones en el escroto. Escroto bifurcado.	Monorquideo. Criptorquideo. Hiperplasia o hipoplasia unilateral o bilateral. Marcada rotación testicular.
5.2 Vaina o prepucio	Reducido y proporcionado al desarrollo del animal	Mediano. Moderadamente peduloso	Excesivo. Excesivamente penduloso. Cualquier señal de cirugía correctiva.
5.3 Mucosa prepucial	Recogida con la abertura dirigida hacia delante.	Moderadamente relajada.	Prolapsada.
5.4 Ubre y Pezones	Funcional, bien conformada cubierta de piel fina y flexible, bien pigmentada pezones medianos a pequeños y bien distribuidos. De conformación y desarrollo norma.		Ubre reducida y asimétrica. Pendulosa. Pezones gruesos y largos.
5.5 Vulva	De conformación y desarrollo normal.		Atrofiada
<b>6 PELAJE</b>			
6.1 Color.	Gris en sus diferentes tonalidades. Rojo uniforme en sus diferentes tonalidades. Tercio anterior y posterior generalmente mas oscuro en los machos; en las hembras el pelaje es más claro.	Pequeñas manchas más claras o más oscuras. Manchas blancas o negras en papada "Gargantillo" solo para fines comerciales y no para juzgamientos.	Negro azabache. Manchado de negro y blanco. Manchas blancas bien definidas. Albinas y "grullas"
6.2 Pelos.	Cortos, finos y brillantes.	Largo en climas fríos	Gruesos y opacos.

6.3 Piel.	Suelta, fina, suave, flexible y oleosa. Bien pigmentada.	Ligera despigmentación en las partes sombreadas.	Despigmentación en partes no sombreadas.
<b>OBSERVACIONES:</b>			
No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía.			