



ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE CEBU

PATRON DE LA RAZA GUZERAT

NOMENCLATURA	IDEALES	PERMISIBLES	QUE DESCALIFICAN
1 APARIENCIA GENERAL			
1.1 Estado General.	Sano y vigoroso.		
1.2 Desarrollo.	Bueno de acuerdo a la edad.	Medio	Tamaño y peso reducidos en relación a la edad.
1.3 Constitución, Esqueleto y Musculatura.	Constitución robusta. Esqueleto fuerte. Musculatura compacta Y bien distribuida por todo el cuerpo.	Constitución media. Esqueleto y Musculatura regulares.	Constitución débil o tosca. Conformación leonina. Mala distribución muscular y exceso de gordura.
1.4 Masculinidad y Femenidad.	Bien definida, de acuerdo con el sexo.		Caracteres invertidos.
1.5 Temperamento.	Activo y dócil.		Nervioso o bravo.
2 CABEZA			
2.1 Apariencia General.	Ancha. Relativamente corta e expresiva	De ancho y largo medios	Pesada. Asimétrica.
2.2 Perfil .	De sub-cóncavo corta y expresiva.	Con ligera convexidad a nivel de la arcada orbitaria.	Convexo.
2.3 Frente.	Moderadamente ancha, con ligera concavidad (semejante a un plato) entre los ojos y el testuz. Menos anchas en las hembras.		
2.4 Región Paranasal (Cara).	Recto, ancho y proporcionalmente en los machos. Mas estrecha y delicado en las hembras.		Desvío. Depresión. Convexidad (acarnerado). Excesivamente largo y estrecho.
2.5 Hocico.	Negro, dilatado. Un poco achatado hacia la cara. De contorno saliente. Ollares dilatados.	Parcialmente marmorizado.	Espejo nasal total o parcialmente claro. Labio leporino.
2.6 Ojos.	Negros. Elípticos. Oritas ligeramente salientes. Protegidos, en los toros, por arrugas de la piel, en los párpados superiores. Pestañas negras. Mirar vivo.	Gateados. Pestañas mezcladas. Ceguera unilateral adquirida.	Exoftálmicos (saltones) Pestañas blancas o rojizas. Ceguera bilateral.
2.7 Orejas.	Medias, relativamente anchas, pendientes y de puntas redondeadas. Vistas de frente , se muestran medianamente vueltas hacia la cara. Borde inferior con ligera entrada. Cara interna de color anaranjado, con o sin manchas negras (virgulas).	Apéndices suplementarios (doble oreja). Falta de entrada en el borde inferior.	Excesivamente cortas o largas.
2.8 Cuernos.	Desarrollados. Simétricos de sección circular o elíptica en la base, dirigiéndose horizontalmente para afuera al salir del cráneo, curvándose para arriba en forma de lira con las puntas vueltas para adentro y para atrás	Anillos claros. Depresión en la base, cubierta de cuero cabelludo. Descorné opcional de machos con fines comerciales, sin poder participar en juzgamientos.	Cortos. Claros , sin forma de lira o turquez. Dirigidos hacia el frente
2.9 Boca.	De abertura media. Labios firmes.		Prognatismo o agnatismo
3 PESCUEZO Y CUERPO			

3.1 Pescuezo.	Medio. Línea superior ligeramente oblicua, con ligera conveidad al aproximarse a la nuca. Bien musculoso y con implantación armoniosa al tronco. Delicado en las hembras.		Excesivamente corto y grueso. Excesivamente largo y fino.
3.2 Papada.	Comienza bifida debajo de la mandíbula inferior, media con pliegues, suelta, flexible, extendiéndose hasta el ombligo. Entrada en el tercio medio.		Reducida.
3.3 Pecho.	Ancho, con buena cobertura muscular.		Estrecho.
3.4 Giba.	Bien implantada sobre la cruz desarrollada en forma de riñón o castaña de cajú, apoyándose sobre el dorso en los machos. Menos desarrollado y caracterizado en cuanto a forma y apoyo en las hembras.	Ligeramente inclinado. Pequeñas depresiones laterales.	Poco desarrollada. Adelantada o redonda en los machos. Excesivamente inclinada, caída o cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
3.5 Dorso y Lomo.	Largo, ancho, recto, levemente inclinado, tendiendo a la horizontal armoniosamente ligado a la grupa, presentando buena cobertura muscular.		Fuertemente inclinado. Presencia de Lordosis, Sifosis o Escoliosis.
3.6 Ancas y Grupa.	Ancas bien separadas y en el mismo nivel, moderadamente salientes. Grupa larga, ancha tendiendo a la horizontal, en el mismo nivel y unida al lomo sin salientes o depresiones y bien revestida de músculos.	Ligeramente inclinada.	Ancas poco separadas, demasiado salientes. Grupa estrecha, corta, excesivamente inclinada y pobre de músculos.
3.7 Sacro.	Largo, no saliente, en el mismo nivel de las ancas.	Ligeramente saliente.	Muy saliente. Excesivamente corto.
3.8 Cola y Mota (Mechón).	Cola con inserción armoniosa, sobrepasado los corvejones. Mota negra.	Mota mezclada o blanca, en los animales de pelaje claro.	Cola con inserción muy defectuosa. Mota blanca o rojiza.
3.9 Toráx, Costillas, Flancos y Vientre.	Tórax amplio, ancho y profundo. Costillas separadas, largas anchas, bien arqueadas con espacios intercostales bien revestidos de músculos, sin depresiones detrás de la espalda.	Ligera depresión detrás de la espalda, flancos llenos y profundos, vientre en una misma línea paralela al dorso y al lomo.	Tórax deprimido (acoletado), poco arqueamiento de costillas.
3.10 Ombligo.	Reducido. Proporcional al desarrollo del animal.	Medio.	Exageradamente corto o largo. Penduloso, en machos que sobrepase el orificio del prepucio. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
4 MIEMBROS			
4.1 Miembros Anteriores.	De largo medio, bien musculosos colocados en rectángulo, separados y bien aplomados. Espalda larga y oblicua, bien cubiertas de músculos, insertándose armoniosamente al tórax.		Excesivamente largos o cortos en desproporción al cuerpo. Aplomos defectuosos.
4.2 Miembros Posteriores.	De largo medio, muslos y piernas anchas, con buena cobertura muscular, descendiendo hasta los corvejones con nalgas bien pronunciadas. Piernas aplomadas y separadas.		Excesivamente largos o cortos, en desproporción al cuerpo. Excesivamente rectos o curvos u otros defectos de aplomo. Músculos y nalgas con deficiente formación muscular.

4.3 Pezuñas.	Negras, bien conformadas y resistentes.		Blancas o rayadas.
5 ÓRGANOS GENITALES			
5.1 Bolsa Escrotal y Testículos.	Bolsa escrotal constituida por piel fina, flexible y bien pigmentada, conteniendo dos testículos de desarrollo norma.		Criptorquidismo. Monorquedismo. Hipoplasia. Heperplasia.
5.2 Vaina.	Reducida, proporcional al desarrollo del animal.	Media.	Excesiva. Cualquier señal de cirugía plástica correctiva.
5.3 Prepucio.	Recogido, con abertura dirigida hacia delante. Funcional.	Pequeño prolapso.	Prolapsado. Excesivamente penduloso.
5.4 Ubre y Pezones.	Ubre de volumen medio, recubierta de piel fina y sedosa, con pezones de pequeños a medios y bien distribuidos.		Ubre pendolosa o subdesarrollada. Pezones gruesos y largos.
5.5 Vulva	De conformación y desarrollo normales.		Atrofiada.
6 PELAJE			
6.1 Color.	Gris, gris claro a gris oscuro. Tercios anteriores y posteriores generalmente más oscuros alcanzando a veces el negro. En las hembras el pelaje es más claro	Blanco en las hembras. Tonalidades rojizas en el testuz. Pequeñas variaciones de tono.	Totalmente negro. Rojo claro. Amarillo-cobre. Rojo. Blanco en los machos. Manchas.
6.2 Pelos.	Finos, cortos y sedosos. Tolerándose más largos en climas templados o húmedos.		
6.3 Piel.	Negra u oscura, suelta, fina y flexible, suave y oleosa, rosada en las partes sombreadas.		Despigmentación en partes no sombreadas.
OBSERVACIONES:			
No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía.			